

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

REPARIL 20 mg Comprimés Gastro-résistants

Aescine

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Reparil Comprimés Gastro-résistants et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Reparil Comprimés Gastro-résistants
3. Comment prendre Reparil Comprimés Gastro-résistants
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Reparil Comprimés Gastro-résistants
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE REPARIL COMPRIMÉS GASTRO-RÉSISTANTS ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ

Reparil Comprimés Gastro-résistants est un produit qui agit sur les veines et le gonflement.

Reparil Comprimés Gastro-résistants peut être utilisé dans les maladies veineuses: insuffisance veineuse, phlébite, varices et ulcères variqueux, de même en cas de crise hémorroïdaire.

Reparil Comprimés Gastro-résistants peut également être utilisé en cas de gonflement suite à un traumatisme (coup ou blessure).

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 jours.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE REPARIL COMPRIMÉS GASTRO-RÉSISTANTS

Ne prenez jamais Reparil Comprimés Gastro-résistants

- si vous êtes allergique à l'aescine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

- si vous souffrez d'une insuffisance de fonctionnement des reins ou si vous avez une maladie des reins.
- pendant la grossesse et la période d'allaitement.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Reparil Comprimés Gastro-résistants.

- Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique "Autres médicaments et Reparil Comprimés Gastro-résistants".
- Dans la maladie des veines, le traitement par médicaments doit s'accompagner d'autres mesures telles que le port de bas de contention pour varices, pratique de la marche, etc.
- Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
- Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

Enfants

Les comprimés gastro-résistants ne doivent pas être donnés à des enfants de moins de 12 ans.

Autres médicaments et Reparil Comprimés Gastro-résistants

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Ne pas utiliser Reparil Comprimés Gastro-résistants sans avis médical si vous prenez des médicaments anticoagulants oraux, des antibiotiques aminoglycosides ou du groupe des céphalosporines.

Reparil Comprimés Gastro-résistants avec des aliments et boissons.

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

Le Reparil Comprimés Gastro-résistants est contre-indiqué pendant la grossesse et sera évité pendant la lactation.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

Reparil Comprimés Gastro-résistants contient du lactose, du saccharose et du sodium.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ce médicament contient moins de 1mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c.-à-d. qu'il est essentiellement 'sans sodium'.

3. COMMENT PRENDRE REPARIL COMPRIMÉS GASTRO-RÉSISTANTS

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Sauf avis contraire du médecin, les comprimés gastro-résistants seront pris pendant ou juste après les repas.

La dose de départ recommandée chez l'adulte est de 3 fois 2 comprimés gastro-résistants par jour, cette dose sera réduite au fur et à mesure de la guérison.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

A partir de 12 ans et jusqu'à 14 ans, la dose maximale est de 2 ou 3 fois 1 comprimé gastro-résistant par jour.

Les comprimés gastro-résistants ne doivent pas être donnés à des enfants de moins de 12 ans.

Le traitement ne doit pas être poursuivi pendant plus de trois mois sans réévaluation de la symptomatologie.

Votre médecin vous dira combien de temps vous devrez utiliser Reparil Comprimés Gastro-résistants.

Si vous avez pris plus de Reparil Comprimés Gastro-résistants que vous n'auriez dû

Si vous avez pris trop de Reparil Comprimés Gastro-résistants, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245.245).

Si vous oubliez de prendre Reparil Comprimés Gastro-résistants

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Reparil Comprimés Gastro-résistants

Il est déconseillé d'arrêter seul le traitement prescrit, demandez au préalable l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Expliquez-lui pourquoi vous voulez arrêter le traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Très rarement, et dès le début du traitement, peuvent apparaître des maux d'estomac, des nausées, du prurit, parfois de la diarrhée. Ces effets disparaissent lorsqu'on diminue la dose. Un arrêt du traitement est rarement nécessaire.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Division Vigilance

Boîte postale 97

1000 Bruxelles

Madou

Site internet : www.notifieruneffetindesirable.be

E-mail : adr@afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5 COMMENT CONSERVER REPARIL COMPRIMÉS GASTRO-RÉSISTANTS

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver à température ambiante, entre + 15°C et + 25°C

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette et l'emballage après la mention « EXP. » La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Reparil Comprimés Gastro-résistants

- La substance active est l'Aescine
- Les autres composants sont :
 - Lactose 1H₂O - Polyvidone (M39600) - Magnesium Stearate
 - *Enrobage* : Saccharose – Talc - Acacia gum. - Titanium dioxide (E171) - Colloïdal anhydrous silica - Poly(ethylacrylate, methacrylic acid) 1:1,(M250000) - Macrogol 8000 - Sodium hydroxide - Carmellose sodium - Triethyl citrate - Simethicone emulsion - Cire d'abeille - Cire Carnauba (voir rubrique 2 Reparil Comprimés Gastro-résistants contiennent du lactose, du saccharose et du sodium)

Aspect de Reparil Comprimés Gastro-résistants et contenu de l'emballage extérieur

Comprimés gastro-résistants en boîtes de 100 comprimés gastro-résistants présentés sous plaquette thermoformée Alu/PVC à 20 comprimés gastro-résistants.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché :

Viartis Healthcare

Terhulpesteenweg 6A

B-1560 Hoeilaart

Fabricant :

Madaus GmbH, D-51101 – Cologne, Allemagne

Numéro d'Autorisation de Mise sur le Marché

BE044055

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 03/2023.

La notice est approuvée en 04/2023.